

Domande e risposte su Paxlovid per i pazienti

Cos'è Paxlovid?

Paxlovid è un farmaco antivirale a base di due principi attivi, nirmatrelvir (PF-07321332) e ritonavir, per il trattamento precoce della malattia COVID-19.

In quali casi è indicato?

È indicato per il trattamento di pazienti adulti (età ≥18 anni) con infezione confermata da SARS-CoV-2 che:

- non necessitano di ossigenoterapia;
- sono a elevato rischio di progressione a COVID-19 severa (ad esempio i pazienti affetti da patologie oncologiche, malattie cardiovascolari, diabete mellito non compensato, broncopneumopatia cronica e obesità grave).

Necessita di prescrizione medica?

Sì, è necessaria la prescrizione del medico di medicina generale o di uno dei centri specialistici COVID-19 individuati dalle Regioni.

Dove è possibile reperire il farmaco?

Con la ricetta del medico il farmaco può essere ritirato direttamente in farmacia, senza costi a carico del paziente.

Quando deve essere avviato il trattamento?

Il trattamento deve essere iniziato il più precocemente possibile, e comunque entro 5 giorni dall'insorgenza dei sintomi.

Come si assume Paxlovid?

Il trattamento con Paxlovid prevede l'assunzione di 2 compresse di PF-07321332 (compressa rosa ovale) e di 1 di ritonavir (compressa a forma di capsula, bianca) ogni 12 ore per 5 giorni. Le tre compresse devono essere assunte insieme, deglutite intere e non masticate, né spezzate o frantumate. Possono essere assunte con il cibo o lontano dai pasti.

Cosa fare se si salta una dose di Paxlovid?

Se si salta una dose di Paxlovid entro 8 ore dall'orario abituale, la dose deve essere assunta il prima possibile. Se sono trascorse oltre 8 ore, la dose dimenticata non va assunta ma bisogna prendere regolarmente quella successiva secondo l'orario previsto. Non assumere una doppia dose per compensare la dose dimenticata.

Qual è il contenuto di una confezione di Paxlovid?

Ogni confezione contiene 5 blister, uno per ogni dose giornaliera, per un totale di 30 compresse. Ogni blister è schematicamente suddiviso in due segmenti con il simbolo del sole e della luna contenenti ognuno 2 compresse di PF-07321332 (compressa rosa ovale) e 1 di ritonavir (compressa a forma di capsula, bianca) da assumere, rispettivamente, al mattino e alla sera.

Ci sono farmaci che potrebbero interagire con Paxlovid?

Sì, è quindi opportuno fare il punto con il proprio medico sui farmaci che si stanno assumendo. Il medico potrà consigliare al paziente, a seconda dei casi, di sospendere le terapie in corso per la durata del trattamento con Paxlovid, di assumerle contemporaneamente a Paxlovid, ma seguendo specifiche avvertenze; di proseguire con le terapie in corso e non assumere Paxlovid.

Si può assumere Paxlovid in gravidanza?

Non ci sono dati relativi all'uso di Paxlovid in donne in gravidanza, pertanto in gravidanza non è raccomandata l'assunzione di Paxlovid a meno che le condizioni cliniche rendano necessario il trattamento.

Si può allattare al seno durante il trattamento con Paxlovid?

Durante il trattamento con Paxlovid e per 7 giorni dopo la conclusione della terapia, per precauzione, non bisogna allattare al seno.

Si può assumere Paxlovid se si sta pianificando una gravidanza?

No, se si sta assumendo Paxlovid bisogna evitare di intraprendere una gravidanza durante il trattamento e, come misura precauzionale, per 7 giorni dopo il suo completamento.

Durante il trattamento con il farmaco e fino a un ciclo mestruale successivo al suo completamento, poiché i contraccettivi ormonali combinati, in associazione a Paxlovid, potrebbero risultare meno efficaci, è bene ricorrere a un metodo contraccettivo alternativo o aggiuntivo (di barriera).

Si può assumere Paxlovid in presenza di una patologia renale?

In caso di patologia renale, il medico indicherà al paziente il dosaggio appropriato di Paxlovid. In caso di compromissione renale grave il farmaco non è raccomandato.

È possibile assumere il farmaco in caso di compromissione epatica grave?

No, in tal caso Paxlovid non è raccomandato.

In caso di peggioramento delle condizioni cliniche il farmaco va interrotto?

No, è raccomandato il completamento dell'intero ciclo di trattamento di 5 giorni anche in caso di ricovero in ospedale per progressione a COVID-19 di grado severo o critico.

Quali sono i possibili effetti indesiderati di Paxlovid?

Gli effetti indesiderati più comuni (possono interessare fino a 1 persona su 10) sono alterazione del gusto, diarrea, vomito e mal di testa.

Questo documento è una sintesi non esaustiva delle informazioni disponibili su Paxlovid. Per qualsiasi ulteriore informazione o approfondimento si raccomanda di consultare il proprio medico e il farmacista e di leggere il Foglio Illustrativo del farmaco e i documenti pubblicati sul portale AIFA.

LINK UTILI

Usò degli antivirali orali per COVID-19: <https://www.aifa.gov.it/uso-degli-antivirali-orali-per-covid-19>

Paxlovid. Foglio Illustrativo (FI): <https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/bancadatifarmaci/farmaco?farmaco=049853>

Paxlovid. Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP): <https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/bancadatifarmaci/farmaco?farmaco=049853>