

Cari Colleghi,

Vi segnalo oggi che il Comitato per la Valutazione dei Rischi per la Farmacovigilanza (PRAC) dell'EMA ha raccomandato restrizioni all'uso dei medicinali contenenti codeina per la tosse e il raffreddore nei bambini a causa del rischio di gravi effetti collaterali, tra cui problemi respiratori.

Buona lettura,
Luca Pani

17 marzo 2015

Il PRAC raccomanda restrizioni all'uso della codeina per la tosse e il raffreddore nei bambini

Il Comitato per la Valutazione dei Rischi per la Farmacovigilanza (PRAC) dell'EMA ha raccomandato restrizioni all'uso dei medicinali contenenti codeina per la tosse e il raffreddore nei bambini a causa del rischio di gravi effetti collaterali, tra cui problemi respiratori. In particolare, il PRAC raccomanda che la codeina venga controindicata nei bambini al di sotto dei 12 anni: non deve quindi essere utilizzata in questo gruppo di pazienti. L'uso della codeina per la tosse e il raffreddore non è raccomandato inoltre nei bambini e negli adolescenti tra i 12 e i 18 anni di età con problemi respiratori. Tutti i medicinali contenenti codeina in forma liquida devono poi essere disponibili in contenitori con chiusura "a prova di bambino" per evitarne l'ingestione accidentale.

Vai sul sito AIFA per la notizia originale

17 marzo 2015

"Pillole dal Mondo" è un'iniziativa di AIFA per i Medici e gli Operatori Sanitari

Realizzato dall'Ufficio Stampa e della Comunicazione AIFA - Direttore Arianna Gasparini

Questa email Le è stata inviata in quanto Lei risulta registrato sul sito dell'AIFA o a Medikey. Per aggiornare o modificare il suo profilo o se non desidera più ricevere la presente newsletter, scriva a news@aifa.gov.it o a **Medikey**. L'esercizio dei suoi diritti è regolato dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 7 D.Lgs. 196/2003 – www.agenziafarmaco.gov.it/it/privacy).