

AREA	CODICE	RICERCATORE	ISTITUZIONE	UNITÁ	TITOLO IN INGLESE	TITOLO IN ITALIANO	DATA INIZIO PROGETTO	Finanziato AIFA
1	FARM52EBT5	Nicolino Ruperto	IRCCS ISTITUTO G. GASLINI	PEDIATRIA II, REUMATOLOGIA - PRINTO	Phase III effectiveness randomised actively controlled clinical trial in new onset juvenile dermatomyositis: prednisone versus prednisone plus cyclosporine a versus prednisone plus methotrexate	Studio clinico randomizzato di fase III di efficacia nella dermatomiosite iniziale giovanile: prednisone vs. prednisone più il cyclosporina vs. prednisone più methotrexato	01/08/2006	230.000
1	FARM53APAH	Davide Pareyson	FONDAZIONE IRCCS DI RILIEVO NAZIONALE ISTITUTO NAZIONALE NEUROLOGICO C. BESTA		Multicentre randomised double blind placebo controlled trial of long-term ascorbic acid treatment in Charcot-Marie-Tooth disease type 1a (CMT-TRIAAL: CMT-TRial Italian with Ascorbic Acid Long term)	Trial multicentrico randomizzato in doppio cieco controllato con placebo sul trattamento a lungo termine con acido ascorbico nella malattia di Charcot-Marie-Tooth di tipo 1A (CMT-Trial: CMT-Trial Italian with Ascorbic Acid Long term)	22/09/2006	140.000
1	FARM53XBKT	Alessandro Filla	UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI	DIPARTIMENTO DI SCIENZE NEUROLOGICHE	Growth hormone in patients with amyotrophic lateral sclerosis as add-on therapy to Riluzole.	Ormone della crescita in pazienti con sclerosi laterale amiotrofica come terapia aggiunta al riluzolo.	22/09/2006	110.000
1	FARM542ZYP	Barbara Ensoli	ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ		Phase II Trial for the Treatment of Advanced Classical Kaposi's Sarcoma with the HIV Protease Inhibitor Indinavir in Combination with Vinblastine/Bleomycin-based Chemotherapy	Trial di fase II per il trattamento del sarcoma di Kaposi classico avanzato con l'inibitore della proteasi indinavir in combinazione con chemioterapia a base di vinblastina/bleomicina	10/11/2006	215.000
1	FARM55BP7R	Franco Locatelli	FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO - PAVIA		Use of anti-cd20 monoclonal antibody (rituximab) for the prevention and/or treatment of EBv-associated lymphoproliferative disease in recipients of hematopoietic stem cell and solid organ transplantation or in patients with primary immunodeficiency	Uso dell'anticorpo monoclonale anti-CD20 (rituximab) per la prevenzione e/o il trattamento della patologia linfoproliferativa EBv-associata in riceventi cellule staminali ematopoietiche e trapianti di organi o in pazienti con immunodeficienza primaria	01/08/2006	150.000
1	FARM573ME8	Fabrizio Tagliavini	FONDAZIONE IRCCS DI RILIEVO NAZIONALE ISTITUTO NAZIONALE NEUROLOGICO C. BESTA		A randomized, double-blind pilot study versus placebo for the evaluation of the efficacy of doxycycline administered by oral route in patients affected by Creutzfeldt-Jakob disease	Studio pilota randomizzato in doppio cieco verso placebo per la valutazione dell'efficacia della doxiciclina per via orale in pazienti affetti da malattia di Creutzfeldt-Jakob	22/09/2006	230.000

1	FARM57EYTA	Paolo Corradini	FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE TUMORI - MILANO		Intensive chemo-immunotherapy as first-line treatment in adult patients with peripheral T-cell Lymphoma (PTCL)	Chemioimmunoterapia intensiva come trattamento di prima linea nei pazienti adulti con linfoma T periferico (PTCL)	06/10/2006	225.000
1	FARM58SK29	Annamaria Colao	UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI	DIPARTIMENTO DI ENDOCRINOLOGIA ED ONCOLOGIA MOLECOLARE E CLINICA	Effectiveness and tolerability of treatment with cabergoline in Cushing's syndrome	Efficacia e tollerabilità del trattamento con cabergolina nella sindrome di Cushing	22/09/2006	225.000
1	FARM59BN99	Giuseppe Rosano	IRCCS SAN RAFFAELE PISANA - ROMA		Evaluation of tolerability and efficacy of the combination Sildenafil/Bosentan in patients with severe pulmonary hypertension	Valutazione di tollerabilità ed efficacia della combinazione sildenafil/bosentan in pazienti con ipertensione polmonare severa	22/09/2006	380.000
1	FARM59J4YY	Stefano Fais	ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ	REPARTO DI FARMACOGNOSTICA, FARMACOCINETICA E TERAPIE Sperimentali	Phase ii clinical study on efficacy of proton pump inhibitors pre-treatment in osteosarcoma patients undergoing chemotherapy	Studio clinico di fase II sull'efficacia del pretrattamento con gli inibitori di pompa protonica nei pazienti affetti da osteosarcoma sottoposti alla chemioterapia	01/08/2006	225.000
1	FARM59T23W	Generoso Andria	UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI	DIPARTIMENTO DI PEDIATRIA	Efficacy and safety of treatment with N-butyl-deoxynojirimycin (NB-DNJ-miglustat) in patients with Niemann-Pick disease type C	Efficacia e sicurezza del trattamento con miglustat in pazienti affetti da malattia di Niemann-Pick di tipo C	22/09/2006	120.000
1	FARM5CA5PS	Paolo G. Casali	FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE TUMORI - MILANO		Trabectedin (ET743) in metastatic or locally advanced myxoid/round cell liposarcoma pretreated with chemotherapy	Trabectedina (ET743) nel liposarcoma mioide metastatico o localmente avanzato pretrattato con chemioterapia	06/10/2006	230.000
1	FARM5JJASJ	Bruno Nobili	SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI	DIPARTIMENTO DI PEDIATRIA	A randomized, open-label therapeutic trial for the evaluation of the efficacy and safety of Neridronate (Nerixia) in the treatment of osteoporosis in patients with Thalassemia Major and Severe Thalassemia Intermedia	Trial terapeutico randomizzato, in aperto, per la valutazione di efficacia e sicurezza del neridronato (Nerixia) nel trattamento dell'osteoporosi nei pazienti con talassemia maggiore e talassemia intermedia severa	01/08/2006	205.000
1	FARM5JRXXM	Alessandro Aiuti	FOND. CENTRO S. RAFFAELE MONTE TABOR HSR-TIGET (ROMA)		Safety and efficacy study of gene therapy with autologous cd34+ cells transfected with a retroviral vector encoding the adenosine deaminase (ADA) gene (emea/od/053/05) for the treatment of severe combined	Studi di sicurezza ed efficacia sulla terapia genica con cellule CD34 + autologhe transfettate con un vettore retrovirale che codifica il gene dell'adenosina deaminasi (ADA)	03/10/2006	250.000

					immunodeficiency due to the lack of ADA	(Emea/OD/053/05) per il trattamento dell'immunodeficienza combinata severa da carenza di ADA		
1	FARM5LRKR9	Ettore Beghi	ISTITUTO MARIO NEGRI		Double-blind placebo-controlled trial on the use of acetyl-L carnitine for the treatment of amyotrophic lateral sclerosis (ALS)	Trial in doppio cieco controllato con placebo sull'uso dell'acetyl-L carnitina per il trattamento della sclerosi laterale amiotrofica (ALS)	01/08/2006	193.000
1	FARM5MATC7	Generoso Andria	UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI	DIPARTIMENTO DI PEDIATRIA	Multicenter study of the efficacy and tolerability of tetrahydrobiopterin in a pediatric population affected by phenylketonuria	Studio multicentrico sull'efficacia e la tollerabilità della tetraidrobiopterina nella popolazione pediatrica affetta da fenilchetonuria	22/09/2006	127.500
1	FARM5S3JT5	Giancarlo Parenti	UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI	DIPARTIMENTO DI PEDIATRIA	Evaluation of the efficacy of the treatment with ACE-inhibitors on the renal damage in patients affected by glycogen storage disease type 1a and type 1b and of the vitamin E on neutropenia of patients with glycogen storage disease 1b	Valutazione dell'efficacia del trattamento con Ace-inibitori nel danno renale in pazienti affetti da patologia da glicogenosi, di tipo 1a e 1b, e della vitamina E nella neutropenia in pazienti con glicogenosi di tipo 1b	22/09/2006	146.000
1	FARM5X8AWM	Armando Gabrielli	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLE MARCHE (ANCONA)	DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE	Rare Diseases with microvascular involvement. High Dose Intravenous N-acetylcysteine versus Iloprost for early, rapidly progressive diffuse Systemic Sclerosis (Scleroderma)	Patologie rare con coinvolgimento microvascolare. Alto dosaggio intravenoso di N-acetilcisteina contro ilprost per la sclerosi progressiva sistemica (scleroderma)	19/12/2006	225.000
1	FARM5XWMZ4	Natale G. De Santo	SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI	CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA CLINICA	Therapy of hyperhomocysteinemia in hemodialysis patients: effects of acetylcysteine and folates	Terapia dell'iperomocisteinemia nei pazienti in emodialisi: effetti dell'acetilcisteina e dei folati	01/08/2006	170.000
1	FARM5YZTZW	Alessandro Lambiase	UNIVERSITÀ ROMA - CAMPUS BIOMEDICO	CLINICA OCULISTICA	Multicenter, randomised, double masked, controlled studies on the efficacy of Cyclosporine eye drop treatment in preventing Vernal Keratoconjunctivitis (VKC) relapses and in treating the acute phase	Studio multicentrico, doppio cieco, randomizzato, controllato sull'efficacia del trattamento con gocce oculari di ciclosporina nella prevenzione della cheratocongiuntivite (VKC), nel trattamento della fase acuta e nelle ricadute	19/12/2006	225.000
2	FARM537JNE	Giovanni Strippoli	CONSORZIO MARIO NEGRI SUD		Cardio-renal effects of renin angiotensin system inhibition in cardio-renal risk patients: comparative randomized trial of	Effetti cardio-renal dell'inibizione del sistema renina-angiotensina in soggetti a rischio cardio-	01/08/2006	2.250.000

					angiotensin converting enzyme inhibitors, angiotensin receptor blockers or their combination in patients with one or more cardiovascular risk factors, screen positive for albuminuria or proteinuria, diabetic or not diabetic. The cardio-renal protection trial	renale: studio di confronto randomizzato tra ACE-inibitori, antagonisti recettoriali e terapia combinata con le due classi di farmaci in soggetti con uno o più fattori di rischio cardiovascolare, positivi allo screening per albuminuria, diabetici e non diabetici		
2	FARM55L9BE	Giuseppe Remuzzi	ISTITUTO MARIO NEGRI		A prospective, randomized, open label blinded end point (PROBE) trial to evaluate whether, at comparable blood pressure control, combined therapy with the ace inhibitor benazepril and the angiotensin ii receptor blocker (ARB) valsartan reduces progression to esrd more effectively than benazepril or valsartan alone in high risk patients with type 2 diabetes and overt nephropathy (VALID study)	Trial randomizzato, prospettico, multicentrico per confrontare l'effetto sulla prevenzione della nefropatia cronica del trapianto di micofenolato mofetil e azatioprina come monoterapia immunosoppressiva per i riceventi di trapianto renale (Studio ATHENA)	01/08/2006	490.000
2	FARM57W8MN	Antonio Nicolucci	CONSORZIO MARIO NEGRI SUD		A randomized, placebo-controlled study of the efficacy of low-dose aspirin in the prevention of cardiovascular events in subjects with diabetes mellitus treated with statins. (ACCEPT-D: Aspirin and simvastatin Combination for Cardiovascular Events Prevention Trial in Diabetes)	Studio clinico randomizzato sull'efficacia dell'aspirina a basse dosi per la prevenzione degli eventi cardiovascolari nei soggetti con diabete mellito trattati con statine (ACCEPT-D: studio di combinazione di aspirina e simvastatina per la prevenzione di eventi cardiovascolari nel diabete)	01/08/2006	2.700.000
2	FARM58J2XH	Leonardo M. Fabbri	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MODENA E REGGIO EMILIA	DIPARTIMENTO INTEGRATO DI ONCOLOGIA ED EMATOLOGIA	Comparison of a serum procalcitonin (pro-ct)-guided treatment plan with the standard guideline recommended antibiotic treatment plan for patients hospitalized with a diagnosis of exacerbation of COPD	Confronto tra un piano di trattamento sieroguidato a base di procalcitonina (Pro-Ct), con le linee guida standard del trattamento a base di antibiotici, per i pazienti ospedalizzati con diagnosi di riacutizzazione della COPD	22/09/2006	700.000
2	FARM5C4FB4	Alfredo Falcone	G.O.N.O. GRUPPO ONCOLOGICO DEL NORD-OVEST		An open-label, multicenter, randomized phase III study of second-line chemotherapy with or without bevacizumab in metastatic colorectal cancer patients who have received first-line	Studio in aperto, multicentrico, randomizzato di fase III su chemioterapia di seconda linea con o senza bevacizumab in pazienti con cancro coloretale	22/09/2006	210.000

					chemotherapy plus bevacizumab	metastatico trattati con chemioterapia di prima linea con bevacizumab		
2	FARM5JYE9K	Alberto Zanchetti	IST. AUXOLOGICO ITALIANO-IRCCS - MILANO		PHIDIAS – Prevention of Hypertension Incidence and Diabetes Italian Assessment Study Therapeutic Strategies of Prevention of Diabetes and Hypertension in Subjects with Metabolic Syndrome and High-Normal Blood Pressure	PHIDIAS - Studio italiano di valutazione sulla prevenzione dell'incidenza dell'ipertensione e del diabete. Strategie terapeutiche per la prevenzione del diabete e dell'ipertensione in soggetti con sindrome metabolica e pressione arteriosa elevata-normale	10/11/2006	2.000.000
2	FARM5K3MEE	Sabino De Placido	UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI	DIPARTIMENTO DI ENDOCRINOLOGIA ED ONCOLOGIA MOLECOLARE E CLINICA	FATA – First Adjuvant Trial on All aromatase inhibitors in early breast cancer. A phase 3 study comparing anastrozole, letrozole and exemestane, upfront (for 5 years) or sequentially (for 3 years after 2 years of tamoxifen), as adjuvant treatment of postmenopausal patients with endocrine-responsive breast cancer	FATA - First adjuvant trial on all aromatase inhibitors in early breast cancer. Studio di fase III di confronto tra anastrozolo, letrozolo ed exemestane e tra strategia sequenziale (2 anni di terapia con tamoxifen seguiti da 3 anni di terapia con inibitori delle aromatasi) verso strategia up-front (5 anni di terapia con inibitori delle aromatasi) nel trattamento adiuvante del carcinoma mammario ormono-responsivo in postmenopausa	10/11/2006	2.700.000
2	FARM5L47XH	Pier Mannuccio Mannucci	FONDAZIONE IRCCS OSPEDALE MAGGIORE, MANGIAGALLI E REGINA ELENA - MILANO		A randomized, controlled trial to evaluate the efficacy of low-molecular-weight heparin on pregnancy outcome of women with previous pregnancy complications	Trial randomizzato, controllato per valutare l'efficacia dell'eparina a basso peso molecolare sull'esito della gravidanza in donne con pregresse complicazioni in gravidanza	19/12/2006	620.000
2	FARM5P8YFC	Armando Santoro	REGIONE LOMBARDIA		Top trial: a randomized clinical trial of trastuzumab (herceptin®) optimization in patients with locally advanced and/or metastatic breast cancer overexpressing her2 after a first-line chemotherapy plus trastuzumab	Top trial: trial randomizzato per l'ottimizzazione del trattamento con trastuzumab (Herceptin®) in pazienti con il cancro del seno localmente avanzato e/o metastatico con alti livelli di HER2 dopo una chemioterapia di prima linea con trastuzumab	11/04/2007	520.000
2	FARM5PWB9L	Norberto Perico	ISTITUTO		A randomized, prospective,	Trial prospettico,	01/08/2006	540.000

			MARIO NEGRI		multicenter trial to compare the effect on chronic allograft nephropathy prevention of mycophenolate mofetil versus azathioprine as the sole immunosuppressive therapy for kidney transplant recipients (ATHENA Study)	randomizzato multicentrico per confrontare l'effetto sulla prevenzione della nefropatia cronica del trapianto di micofenolato mofetil e azatioprina impiegati come monoterapia immunosoppressiva cronica nei pazienti con trapianto renale (Studio ATENA)		
2	FARM5RM7KL	Luca Massacesi Istituzione Università degli Studi di Firenze; Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi Unità Dipartimento Scienze Neurologiche e Psichiatriche, Clara Milanese Istituzione Istituto Neurologico Carlo Besta	FONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA – FISM – ONLUS (GENOVA)		Multicenter randomized controlled study of azathioprine versus interferon beta in relapsing-remitting multiple sclerosis	Studio multicentrico randomizzato controllato su azatioprina verso interferone beta nella sclerosi multipla recidivante-remittente	25/01/2007	1.470.000
2	FARM5RWTWZ	Roberto Labianca	FONDAZIONE GISCAD PER LA RICERCA SUI TUMORI - MILANO		A randomized trial investigating the role of FOLFOX-4 regimen duration (3 versus 6 months) and bevacizumab as adjuvant therapy for patients with stage II/III colon cancer	Trial randomizzato per lo studio della durata del regime Folfox-4 (3 o 6 mesi) e di bevacizumab come terapia adiuvante per i pazienti con cancro al colon di stadio II/III	19/12/2006	2.340.800
2	FARM5TPY8X	Piero Ruggenenti	ISTITUTO MARIO NEGRI		A prospective, randomized, open label blinded end point (PROBE) trial to evaluate whether, at comparable blood pressure control, combined therapy with the ace inhibitor benazepril and the angiotensin II receptor blocker (ARB) valsartan, reduces the incidence of microalbuminuria more effectively than benazepril or valsartan alone in hypertensive patients with type 2 diabetes and high-normal albuminuria (VARIETY study)	TTrial prospettico, randomizzato, multicentrico per valutare se a pari controllo pressorio la combinazione di un ACE inibitore e di un antagonista ecettoriale dell'angiotensina II (sartano) riduce più efficacemente dei due farmaci da soli l'incidenza di microalbuminuria in diabetici di tipo 2, pertesi con "high-normal" albuminuria (Studio VARIETY)	01/08/2006	1.950.000
3	FARM52K2WM	Emilio Perucca	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA	DIPARTIMENT O MEDICINA INTERNA E TERAPIA MEDICA	A prospective study on long-term outcome and potential usefulness of an intervention aimed at reducing adverse effects in	Valutazione prospettica dell'outcome a lungo termine e della potenziale utilità di un intervento mirato a ridurre gli	22/09/2006	530.000

					patients with refractory epilepsy	effetti avversi in pazienti con epilessia farmaco-resistente		
3	FARM52NKBR	Carlo Gambacorti Passerini	UNIVERSITÀ MILANO BICOCCA	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E PREVENZIONE	Titolo Long term effects of imatinib administration in chronic myeloid leukemia (CML) patients	Effetti a lungo termine della somministrazione di imatinib nei pazienti affetti da leucemia mieloide cronica (Cml)	10/11/2006	241.450
3	FARM537A8L	Mario Rizzetto	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO	DIPARTIMENTO DI MEDICINA INTERNA	Study of the use in Italy in routine clinical practice of Pegylated Interferons for the therapy of chronic hepatitis C. Proposed by the Società Italiana di Gastroenterologia (SIGE), the Istituto Superiore di Sanità (ISS), the Associazione Italiana dei Gastroenterologi Ospedalieri (AIGO), the Associazione Italiana Studio Fegato (AISF), the Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali (SIMIT)	Studio sull'uso in Italia nella pratica clinica di routine dell'interferone peghilato per il trattamento dell'epatite C cronica	10/11/2006	700.000
3	FARM53J37M	Maria Luisa Bianchi	IIRCCS: ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO IRCCS - MILANO	Centro Malattie Metaboliche Ossee	Improving adherence to the oral therapy of post-menopausal and senile osteoporosis with targeted interventions: a comparison between the standard method of medical prescription and two methods characterized by an increasing involvement of the patient	Miglioramento dell'aderenza alla terapia orale per il trattamento dell'osteoporosi post menopausale e senile con interventi mirati: confronto tra metodo standard della prescrizione medica e due metodi caratterizzati da coinvolgimento crescente del paziente	01/08/2006	250.000
3	FARM54J8WX	Nicola Ferrara	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE	DIPARTIMENTO DI SCIENZE PER LA SALUTE	Evaluation of an educative/informative strategy on drugs use in elderly population with chronic-degenerative diseases in several care setting: a controlled randomised study	Studio randomizzato controllato per la valutazione di una strategia educativa/informativa sull'uso dei farmaci nella popolazione anziana con patologie cronico-degenerative in diversi assetti di cura	22/09/2006	650.000
3	FARM54S73S	Mauro Giovanni Carta	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI	DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA	The use of drugs for mood disorders in Italy	Uso dei farmaci per i disordini dell'umore in Italia	01/08/2006	385.000
3	FARM59NWKF	Nicola Magrini	CEVEAS - AZIENDA USL MODENA		Pharmacists' outreach visits and new information formats: cluster and single-doctor randomised controlled trials for evaluating their feasibility and impact on knowledge, attitudes and prescribing practices of General	Trials randomizzati controllati su cluster e singoli medici per valutare l'impatto di visite informative e di nuovi formati informativi sui comportamenti prescrittivi e su conoscenze e attitudini prescrittive dei	01/08/2006	800.000

					Practitioners in three Italian regions	medici di medicina generale in tre Regioni italiane		
3	FARM59XAYF	Attilio Bianchi	ASUR - AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE-MARCHE		Evaluation of a population-based multi-modal intervention to improve the quality of cancer pain analgesic treatment	Valutazione di un intervento multimodale population-based orientato a migliorare la qualità del trattamento analgesico del dolore nei pazienti affetti da cancro	10/11/2006	640.000
3	FARM5AJL82	Pietro Panei	ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ		Long term safety of the drugs used in the treatment of school-aged children with attention deficit/hyperactivity disorder and epidemiology of the disease in the Italian population	Sicurezza a lungo termine dei farmaci utilizzati nel trattamento dei bambini in età scolare con disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) ed epidemiologia della patologia nella popolazione italiana	19/12/2006	500.000
3	FARM5BMMH5	Achille Patrizio Caputi	S.I.M.G. SOCIETÀ ITALIANA MEDICINA GENERALE		Effectiveness of computerized automatic reminders in improving pharmacological prescription in high-risk cardiovascular patients in primary care: a cluster-randomized controlled trial	Trial randomizzato e controllato a cluster sull'efficienza di memo automatici computerizzati nel migliorare la prescrizione farmacologica nei pazienti ad alto rischio cardiovascolare nelle cure primarie	01/08/2006	400.000
3	FARM5FF44K	Antonio Craxì	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO	DIPARTIMENTO BIOMEDICO DI MEDICINA INTERNA E SPECIALISTICA	A multicenter observational study to evaluate factors influencing efficacy, tolerance and compliance to antiviral treatment with interferon and ribavirin in chronic hepatitis C patients in daily clinical practice	Studio osservazionale multicentrico per valutare i fattori che influenzano l'efficacia, la tollerabilità e la compliance del trattamento antivirale con interferone e ribavirina nei pazienti affetti da epatite C cronica nella pratica clinica quotidiana	19/12/2006	440.000
3	FARM5HS35J	Damiano Abeni	IDI-IST. DERMOPATICO IMMACOLATA IRCCS - ROMA		Evaluation of the impact of writing exercises and educational interventions on quality of life, use of health resources, and adherence to treatment in patients with psoriasis	Valutazione dell'impatto di esercizi scritti ed interventi educazionali sulla qualità della vita, utilizzo delle risorse sanitarie e aderenza al trattamento in pazienti affetti da psoriasi	10/11/2006	323.400
3	FARM5JYS5A	Giovanni Viegi	C.N.R. PISA	ISTITUTO DI FISILOGIA CLINICA	Respiratory allergic diseases: monitoring study of GINA and ARIA guidelines (ARGA)	Allergopatie Respiratorie: studio di monitoraggio delle linee guida GINA, ARIA (ARGA)	01/08/2006	1.700.000
3	FARM5KJ9P5	Silvano Todesco	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E SPERIMENTALE	The risk/benefit profile of biologic agents in real-world rheumatology and dermatology practice	Profilo rischio-beneficio degli agenti biologici nella pratica reumatologica e dermatologica	01/08/2006	465.000

3	FARM5KZ4NJ	Fabio Samani	S.I.M.G. SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA GENERALE - FIRENZE		Evaluation of prescribing pattern and safety profile of antidepressant and antipsychotic medications in Italian general practice	Valutazione sui trend prescrittivi e sul profilo di sicurezza di antidepressivi e antipsicotici nella pratica medica italiana	01/08/2006	380.000
3	FARM5N5MZT	Giovanna Scroccaro	AZIENDA OSPEDALIERA , ISTITUTI OSPITALIERI DI VERONA	DIPARTIMENTO DI FARMACIA	Prophylactic prescription of low molecular weight heparin in the orthopaedic surgical setting: impact of regional guidelines	Profilassi con eparina a basso peso molecolare nella chirurgia ortopedica: impatto delle linee guida regionali	22/09/2006	175.000
3	FARM5NWAAX	Luigi Mezzalana	AZIENDA ULSS 20 - VERONA	DIPARTIMENTO FARMACEUTICO	Italian ISDB study on depression – ISD	Studio italiano ISDB sulla depressione (ISD)	21/12/2006	540.000
3	FARM5SC2J5	Luigi Naldi	CENTRO STUDI GISED - BERGAMO		Establishment of a European surveillance network to assess the long term effectiveness and safety of biological agents, i.e., Tumor Necrosis Factor alpha (TNF-alpha) antagonists and T cell targeted molecules, in the treatment of psoriasis with particular attention to the risk of rare events	Realizzazione di un network europeo di sorveglianza per valutare efficacia e sicurezza a lungo termine degli agenti biologici, quali gli antagonisti del fattore di necrosi tumorale alfa (TNF-alfa) e molecole che hanno come bersaglio le cellule T, nel trattamento della psoriasi con particolare attenzione al rischio di eventi rari	01/08/2006	320.000
3	FARM5STRH9	Bruno Trimarco	UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SCIENZE CARDIOVASCOLARI ED IMMUNOLOGICHE	Improvement of persistence and adherence to diuretic treatment as first choice for hypertension: a study of active pharmacovigilance and pharmacogenetics	Studio di farmacovigilanza attiva e farmacogenetica sul miglioramento della persistenza e dell'aderenza al trattamento diuretico come prima scelta per l'ipertensione	12/09/2006	1.350.000
3	FARM5T8T47	Roberto Marchioli	CONSORZIO MARIO NEGRI SUD		Rischio assoluto cardiovascolare - epidemiologia (RIACE)	Epidemiologia del rischio cardiovascolare assoluto - (RIACE)	10/11/2006	2.000.000
3	FARM5YNXZM	Mario Del Tacca	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA	CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCHE IN FARMACOLOGIA CLINICA E TERAPIA SPERIMENTALE	Safety and effectiveness of antidepressant treatments in general practice: an observational prospective study from the pharmasearch network, with a Pharmacogenetic sub-study on cases of therapeutic drug failure and adverse drug reaction	Sicurezza ed efficacia dei trattamenti antidepressivi in medicina generale: studio osservazionale prospettico della rete Pharmasearch, con un sotto-studio farmacogenetico sui casi di fallimento terapeutico e reazione avversa ai farmaci: studio MEGAND	22/09/2006	200.000